

BASILIO



Representante: FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA

Año de registro: 2015 (España)

Protección: COMUNITARIA

Espiga: Aristada

Altura de la planta: MEDIA (- 5 cm/BOTTICELLI; + 11 cm/CAMARGO;
+ 8 cm/CHAMBO; + 6 cm/MARCOPOLO; - 4 cm/NOGAL)

Índice productivo medio por año (%)

	RED OEVV		RED GENVCE		ÍNDICE MEDIO
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
BASILIO	92,2	103,1	113,6	97,6	101,6
BOTTICELLI (Testigo)	105,1	101,5	107,3	102,9	105,1
CAMARGO				102,9	
CHAMBO				104,0	
MARCOPOLO				111,2	
NOGAL (Testigo)	94,9	98,5	92,7	97,1	95,8
Índice 100 (kg/ha)	4422	5145	5940	4819	5081
Número de ensayos	13	14	26	19	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
BASILIO	107,0	106,3
BOTTICELLI (Testigo)	103,4	106,9
NOGAL (Testigo)	96,6	93,1
Índice 100 (kg/ha)	5562	5544
Número de ensayos	22	23

CICLO

Tipo: INVIERNO (medio alternativo)

Fecha de espigado: PRECOZ A MEDIA (+ 1 días/BOTTICELLI; + 2 días/CAMARGO; 0 días/CHAMBO; - 3 días/MARCOPOLO; + 1 día/NOGAL)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: MEDIA

Oídio (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*): BAJA A MEDIA

Septoria (*Septoria tritici*): MEDIA A ALTA


Roya amarilla (*Puccinia striiformis*): MEDIA A ALTA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: MEDIO A ALTO (- 2,4 kg/hl/BOTTICELLI;
+ 1,6 kg/hl/CAMARGO; + 3,3 kg/hl/CHAMBO; + 1,6 kg/hl/MARCOPOLO; + 0,2 kg/hl/NOGAL)

Peso de 1000 granos: BAJO A MEDIO (- 8,9 g/BOTTICELLI;
- 2,5 g/CAMARGO; - 2,6 g/CHAMBO; - 3,6 g/MARCOPOLO; + 0,8 g/NOGAL)

Contenido en proteína: ALTO (+ 0,7 %/BOTTICELLI; + 0,2 %/CAMARGO;
+ 0,1 %/CHAMBO; - 0,5 %/MARCOPOLO; - 0,1 %/NOGAL)



Grupo de calidad: 2 - 3 (W:203; P/L:1,0)