

# TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2018

# COMPLICE



**Representante:** FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA

**Año de registro:** 2017 (España)

**Protección:** COMUNITARIA

**Espiga:** Aristada

**Altura de la planta:** MEDIA A ALTA (0 cm/BOTTICELLI; + 8 cm/CAMARGO; + 5 cm/CHAMBO; + 3 cm/MARCOPOLO; + 1 cm/NOGAL)

## Índice productivo medio por año (%)

	RED OEVV		RED GENVCE		ÍNDICE
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	MEDIO
<b>COMPLICE</b>	107,7	114,0	109,2	109,9	110,2
BOTTICELLI (Testigo)	100,8	119,1	101,9	99,5	105,3
CAMARGO (Testigo)	101,4	95,5	101,9	103,7	100,6
CHAMBO			103,0	101,0	
MARCOPOLO			110,2	105,1	
NOGAL (Testigo)	97,8	85,5	96,1	96,8	94,1
Índice 100 (kg/ha)	4911	5377	4865	6415	5392
Número de ensayos	14	10	19	18	

## Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
<b>COMPLICE</b>	113,7	107,6
BOTTICELLI (Testigo)	98,2	102,4
CAMARGO (Testigo)	105,3	100,4
CHAMBO	104,2	99,5
MARCOPOLO	107,2	108,2
NOGAL (Testigo)	96,5	97,2
Índice 100 (kg/ha)	5216	6355
Número de ensayos	19	16

## CICLO

**Tipo:** INVIERNO

**Fecha de espigado:** MEDIA A TARDÍA (+ 6 días/BOTTICELLI; + 5 días/CAMARGO; + 4 días/CHAMBO; + 1 día/MARCOPOLO; + 1 día/NOGAL)

## RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

**Encamado:** BAJA A MEDIA

**Oídio (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*):** MEDIA A ALTA

**Septoria (*Septoria tritici*):** MEDIA


**Roya amarilla (*Puccinia striiformis*):** BAJA A MEDIA

## CALIDAD DEL GRANO

**Peso hectolítrico:** MEDIO A ALTO (- 2,8 kg/hl/BOTTICELLI; - 0,1 kg/hl/CAMARGO; + 1,9 kg/hl/CHAMBO; + 0,6 kg/hl/MARCOPOLO; - 0,9 kg/hl/NOGAL)

**Peso de 1000 granos:** MEDIO A ALTO (- 3,4 g/BOTTICELLI; + 3,4 g/CAMARGO; + 3,7 g/CHAMBO; + 2,4 g/MARCOPOLO; + 5,9 g/NOGAL)

**Contenido en proteína:** BAJO A MEDIO (+ 0,1 %/BOTTICELLI; + 0,1 %/CAMARGO; 0 %/CHAMBO; - 0,6 %/MARCOPOLO; - 0,9 %/NOGAL)



**Grupo de calidad:** 3 - 5 (W:159; P/L:1,2)