

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2018



FILON

Representante: FLORIMOND DESPREZ

Año de registro: 2017 (España)

Protección: COMUNITARIA

Espiga: Mocha

Altura de la planta: MEDIA A ALTA (0 cm/BOTTICELLI; + 7 cm/CAMARGO; + 5 cm/CHAMBO; + 3 cm/MARCOPOLO; + 1 cm/NOGAL)

Índice productivo medio por año (%)

	RED OEVV		RED GENVCE		ÍNDICE MEDIO
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
FILON	107,8	144,1	103,4	112,7	117,0
BOTTICELLI (Testigo)	100,8	119,1	101,9	99,5	105,3
CAMARGO (Testigo)	101,4	95,5	101,9	103,7	100,6
CHAMBO			103,0	101,0	
MARCOPOLO			110,2	105,1	
NOGAL (Testigo)	97,8	85,5	96,1	96,8	94,1
Índice 100 (kg/ha)	4911	5377	4865	6415	5392
Número de ensayos	14	10	19	18	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
FILON	114,7	104,2
BOTTICELLI (Testigo)	98,2	102,4
CAMARGO (Testigo)	105,3	100,4
CHAMBO	104,2	99,5
MARCOPOLO	107,2	108,2
NOGAL (Testigo)	96,5	97,2
Índice 100 (kg/ha)	5216	6355
Número de ensayos	19	16

CICLO

Tipo: INVIERNO (medio alternativo)

Fecha de espigado: MEDIA (+ 4 días/BOTTICELLI; + 3 días/CAMARGO; + 2 días/CHAMBO; - 1 día/MARCOPOLO; + 3 días/NOGAL)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: MEDIA A ALTA

Oídio (*Blumeria graminis* f. *sp. tritici*): MEDIA A ALTA

Septoria (*Septoria tritici*): MEDIA A ALTA


Roya amarilla (*Puccinia striiformis*): ALTA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: MEDIO (- 4,1 kg/hl/BOTTICELLI; - 1,4 kg/hl/CAMARGO; + 0,6 kg/hl/CHAMBO; - 0,8 kg/hl/MARCOPOLO; - 2,3 kg/hl/NOGAL)

Peso de 1000 granos: MEDIO (- 7,1 g/BOTTICELLI; - 0,3 g/CAMARGO; - 0,1 g/CHAMBO; - 1,4g/MARCOPOLO; + 2,2 g/NOGAL)

Contenido en proteína: BAJO A MEDIO (0 %/BOTTICELLI; 0 %/CAMARGO; - 0,2 %/CHAMBO; - 0,8 %/MARCOPOLO; - 1,1 %/NOGAL)



Grupo de calidad: 5 (W:181; P/L:1,4)