CEBADA DE INVIERNO

CCL 2017







Representante: AGRUSA Año de registro: 2012 (Italia) Protección: COMUNITARIA

Espiga: 2 carreras

Altura de la planta: ALTA (+ 4 cm/HISPANIC; + 6 cm/MESETA)

Índice productivo medio por año (%)

| | RED GENVCE | | | ÍNDICE |
|--------------------|------------|---------|---------|--------|
| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | MEDIO |
| IDRA | 99,4 | 105,6 | 96,5 | 100,5 |
| HISPANIC (Testigo) | 100,0 | 99,4 | 98,5 | 99,3 |
| MESETA (Testigo) | 100,0 | 100,6 | 101,5 | 100,7 |
| PEWTER | 99,7 | 103,4 | 102,4 | |
| Índice 100 (kg/ha) | 4890 | 6616 | 4640 | 5382 |
| Número de ensayos | 17 | 25 | 14 | |

Índice productivo por zona (%)

| | Zonas Frías | Zonas Templadas |
|--------------------|----------------|--------------------|
| IDRA | 98,1 | 105,2 |
| HISPANIC (Testigo) | 99,0 | 98,9 |
| MESETA (Testigo) | 101,0 | 101,1 |
| PEWTER | 103,7 | 100,7 |
| Índice 100 (kg/ha) | 5641 | 5662 |
| Número de ensayos | 21 | 18 |

CICLO

Tipo: INVIERNO (medio alternativo)

Fecha de espigado: MUY PRECOZ (0 días/HISPANIC; - 4 días/MESETA)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: BAJA A MEDIA

Oídio (Blumeria graminis f. sp. hordei): MUY BAJA A BAJA

Helmintosporiosis reticular (Pyrenophora teres): BAJA A MEDIA

Rincosporiosis (Rhynchosporium secalis): ALTA

Roya parda (Puccinia hordei): BAJA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: ALTO (+1,9 kg/hl/HISPANIC; - 0,5 kg/hl/MESETA)

Peso de 1000 granos: ALTO A MUY ALTO (+3,1g/HISPANIC; +7,5g/MESETA)

Contenido en proteína: MEDIO (-0,1 %/HISPANIC; -0,7 %/MESETA)