

# TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2018



# NEMO

**Representante:** AGRUSA

**Año de registro:** 2015 (Francia)

**Protección:** COMUNITARIA

**Espiga:** Aristada

**Altura de la planta:** MEDIA A ALTA (- 1 cm/BOTTICELLI; + 11 cm/CAMARGO; + 9 cm/CHAMBO; + 7 cm/MARCOPOLO; 0 cm/NOGAL)

## Índice productivo medio por año (%)

	RED GENVCE			ÍNDICE MEDIO
	2015-16	2016-17	2017-18	
<b>NEMO</b>	122,3	110,8	116,2	116,4
<b>BOTTICELLI (Testigo)</b>	110,4	102,9	101,4	104,9
<b>CAMARGO</b>		102,9	105,7	
<b>CHAMBO</b>		104,0	102,9	
<b>MARCOPOLO</b>		111,2	107,1	
<b>NOGAL (Testigo)</b>	89,6	97,1	98,6	95,1
Índice 100 (kg/ha)	6664	4819	6296	5926
Número de ensayos	11	19	18	

## Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
<b>NEMO</b>	118,8	110,3
<b>BOTTICELLI (Testigo)</b>	100,9	102,6
<b>CAMARGO</b>	108,2	100,6
<b>CHAMBO</b>	107,0	99,7
<b>MARCOPOLO</b>	110,1	108,3
<b>NOGAL (Testigo)</b>	99,1	97,4
Índice 100 (kg/ha)	5077	6341
Número de ensayos	19	16

## CICLO

**Tipo:** INVIERNO

**Fecha de espigado:** TARDÍA (+ 8 días/BOTTICELLI; + 6 días/CAMARGO; + 5 días/CHAMBO; + 2 días/MARCOPOLO; + 8 días/NOGAL)

## RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

**Encamado:** ALTA

**Oídio (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*):** BAJA A MEDIA

**Septoria (*Septoria tritici*):** MEDIA

**Roya amarilla (*Puccinia striiformis*):** MEDIA


**Roya parda (*Puccinia triticina*):** BAJA A MEDIA

## CALIDAD DEL GRANO

**Peso hectolítrico:** MEDIO A ALTO (- 3,2 kg/hl/BOTTICELLI; + 0,5 kg/hl/CAMARGO; + 2,5 kg/hl/CHAMBO; + 1,2 kg/hl/MARCOPOLO; - 0,7 kg/hl/NOGAL)

**Peso de 1000 granos:** MEDIO (- 6,8 g/BOTTICELLI; + 0,1 g/CAMARGO; + 0,4 g/CHAMBO; - 0,9 g/MARCOPOLO; + 3,0 g/NOGAL)

**Contenido en proteína:** BAJO (- 0,3 %/BOTTICELLI; - 0,6 %/CAMARGO; - 0,7 %/CHAMBO; - 1,3 %/MARCOPOLO; - 1,0 %/NOGAL)



**Grupo de calidad:** 3 - 5 (W:115; P/L:0,8)