

CEBADA INVIERNO

2021-2022

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (í100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS FRÍAS						
Variedad	2021		2022		Promedio	
	Rendimiento	I100	Rendimiento	I100	2021-2022	i100
RGT ALCANTARA	6728	112	5863	118	6295	115
LG AMPARO	6510	108	5472	110	5991	109
LG CENTELLA	6598	110	5379	108	5989	109
ANSOLA	6447	107	5276	106	5862	107
LG AITANA	6492	108	5091	103	5792	106
MESETA (T)	5964	99	5188	105	5576	102
HISPANIC (T)	6137	102	4940	100	5538	101
PEWTER (T)	5938	99	4748	96	5343	97
Promedio	6338	105	5240	106	5789	106
Promedio (T)	6013	100	4959	100	5486	100
Núm. ensayos	11	11	12	12	23	23



Ensayos ejecutados por institutos de investigación autonómicos en fincas experimentales o de agricultores colaboradores: IFAPA (Andalucía), CTA (Aragón), IRIAF e ITAP (Castilla-La Mancha), ITACyL e ITAGRA (Castilla y León), IRTA (Cataluña), CICYTEX (Extremadura), IMIDRA (Madrid), INTIA (Navarra) y NEIKER (País Vasco).



CEBADA INVIERNO

2021-2022

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS TEMPLADAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS TEMPLADAS						
Variedad	2021		2022		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2021-2022	i100
ANSOLA	7748	108	6346	110	7047	109
RGT ALCANTARA	7360	103	6715	116	7037	109
LG AITANA	7326	102	6226	108	6776	105
HISPANIC (T)	7495	105	5936	103	6715	104
LG AMPARO	7178	100	6200	107	6689	103
LG CENTELLA	7111	99	6020	104	6565	101
MESETA (T)	6806	95	5642	97	6224	96
Promedio	7289	102	6155	106	6722	104
Promedio (T)	7150	100	5789	100	6470	100
Núm. ensayos	6	6	10	10	16	16



CEBADA INVIERNO

2021-2022

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

Variedad	PRECOCIDAD ¹	ALTURA	PESO HECTOLÍTRICO	PESO 1000 GRANOS	PROTEÍNA
ANSOLA	media (-1,5)	baja-media	medio-alto	bajo-medio	bajo-medio
HISPANIC (T)	precoz (-4)	media	bajo-medio	medio	bajo-medio
LG AITANA	precoz (-3,5)	baja-media	medio	medio-alto	medio
LG AMPARO	media (-1,5)	media	alto	medio-alto	medio
LG CENTELLA	media (+1)	media-alta	medio-alto	medio	medio-alto
MESETA (T)	media	media	alto	bajo-medio	medio-alto
PEWTER (T)	tardía (+2)	baja	alto	bajo-medio	medio
RGT ALCANTARA	precoz-media (-2)	baja-media	bajo-medio	medio-alto	medio-alto

¹ En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a MESETA

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Variedad	ENCAMADO	OIDIO	RINCOSPORIOSIS
ANSOLA	baja	baja-media	alta
HISPANIC (T)	baja	baja	media-alta
LG AITANA	baja	baja-media	media
LG AMPARO	media	baja	alta
LG CENTELLA	media-alta	baja	alta
MESETA (T)	media	media	alta
PEWTER (T)	media	media-alta	baja
RGT ALCANTARA	media	baja	alta



EMPRESA COMERCIALIZADORA

Variedad	EMPRESA COMERCIALIZADORA
ANSOLA	FLORIMOND DESPREZ
HISPANIC (T)	FLORIMOND DESPREZ
LG AITANA	LIMAGRAIN IBÉRICA
LG AMPARO	LIMAGRAIN IBÉRICA
LG CENTELLA	LIMAGRAIN IBÉRICA
MESETA (T)	FLORIMOND DESPREZ
PEWTER (T)	AGRUSA
RGT ALCANTARA	RAGT IBÉRICA

