

TRITICALE

2021-2022

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS-TEMPLADAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS FRÍAS-TEMPLADAS						
Variedad	2021		2022		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2021-2022	i100
RGT ZARAGOZAC	6186	118	3633	108	4909	114
RAMDAM	5956	114	3143	93	4550	106
TRIMOUR (T)	5244	100	3362	100	4303	100
KITESURF	5347	102	3101	92	4224	98
Promedio	5683	108	3310	98	4497	104
Promedio (T)	5244	100	3362	100	4303	100
Num ensayos	8	8	6	6	14	14

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS TEMPLADAS-CÁLIDAS



Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (i100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS TEMPLADAS-CÁLIDAS						
Variedad	2021		2022		Promedio	
	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2021-2022	i100
RGT BELLOTAC	5940	118	4517	102	5229	111
LG PLUTON	5693	113	4668	106	5181	110
BONDADOSO (T)	5133	102	4562	103	4848	102
VIVACIO (T)	4973	98	4256	97	4615	98
RAMDAM	4387	87	3307	75	3847	81
Promedio	5225	103	4262	97	4744	100
Promedio (T)	5053	100	4409	100	4731	100
Num ensayos	6	6	8	8	14	14



Ensayos ejecutados por institutos de investigación autonómicos en fincas experimentales o de agricultores colaboradores: IFAPA (Andalucía), CTA (Aragón), IRIAF e ITAP (Castilla-La Mancha), ITACyL e ITAGRA (Castilla y León), IRTA (Cataluña), CICYTEX (Extremadura), IMIDRA (Madrid), INTIA (Navarra) y NEIKER (País Vasco).



TRITICALE

2021-2022

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

VARIEDAD	PRECOCIDAD ¹	CICLO	ALTURA ²	PESO HECTOLÍTRICO ²	PESO 1000 GRANOS ²	PROTEÍNA ²
BONDADOSO (T)	precoz (-2)	primavera	baja-media	medio-alto	alto	media
KITESURF	tardía (+7)	invierno	alta	alto	alto	media-alta
LG PLUTON	precoz a media (+2)	primavera	media-alta	medio-alto	medio	media
RAMDAM	tardía (+6,5)	invierno	media	bajo	bajo-medio	media-alta
RGT BELLOTAC	precoz (-2)	primavera	alta	alto	medio-alto	media
RGT ZARAGOZAC	media a tardía (+3)	invierno	alta	alto	medio-alto	media-alta
TRIMOUR (T)	media a tardía	Invierno	baja-media	bajo	bajo-medio	baja-media
VIVACIO (T)	precoz	primavera	media	alto	medio-alto	media-alta

¹ En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a TRIMOUR (variedades en zonas templadas-frías) o VIVACIO (variedades en zonas templadas-cálidas)

² Caracterización respecto el ciclo correspondiente de la variedad.

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

VARIEDAD	ENCAMADO	OIDIO	ROYA AMARILLA
BONDADOSO (T)	baja-media	baja-media	baja
KITESURF	baja-media	alta	alta
LG PLUTON			
RAMDAM	media	baja-media	alta
RGT BELLOTAC			
RGT ZARAGOZAC			
TRIMOUR (T)	baja-media	baja	alta
VIVACIO (T)	baja	baja-media	baja



EMPRESA COMERCIALIZADORA

VARIEDAD	EMPRESA COMERCIALIZADORA
BONDADOSO (T)	AGROVEGETAL
KITESURF	CAUSSADE SEMILLAS S.L.
LG PLUTON	LIMAGRAIN IBÉRICA
RAMDAM	AGRUSA
RGT BELLOTAC	RAGT IBERICA
RGT ZARAGOZAC	RAGT IBERICA
TRIMOUR (T)	FLORIMOND DESPREZ
VIVACIO (T)	FLORIMOND DESPREZ

