TRITICALE

2025-2026

PRODUCCIÓN DE GRANO ZONAS FRÍAS-TEMPLADAS

Rendimiento (kg/ha) e Índice productivo (í100, %) en dos años GENVCE. Variedades testigo (T)

ZONAS FRÍAS-TEMPLADAS						
	2025		2026		Promedio	
Variedad	Rendimiento	i100	Rendimiento	i100	2025-2026	i100
RGT ELEAC (T)	5441	106	4765	96	5103	101
TRIMOUR (T)	4790	94	5139	104	4965	99
RGT QUATERBAC	4956	97	4933	100	4945	98
Promedio	5062	99	4946	100	5004	99
Promedio (T)	5116	100	4952	100	5034	100
Núm. ensayos	6	6	8	8	14	14



*Ensayos ejecutados por institutos de investigación autonómicos en fincas experimentales o de agricultores colaboradores: IFAPA (Andalucía), CTA (Aragón), IRIAF e ITAP (Castilla-La Mancha), ITACyL e ITAGRA (Castilla y León), IRTA (Cataluña), CIAM (Galicia), CICYTEX (Extremadura), IMIDRA (Madrid), INTIA (Navarra) y NEIKER (País Vasco). Elaboración ficha: IRTA. Coordinación GENVCE: OEVV-MAPA. Los resultados de estos ensayos pueden consultarse en el mapa de resultados de GENVCE (*www.genvce.org/mapa-de-resultados*).*

TRITICALE

2025-2026

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y CALIDAD DE GRANO

VARIEDAD	PRECOCIDAD[1]	CICLO	ALTURA	PESO ESPECÍFICO	PESO GRANO	PROTEÍNA
RGT ELEAC (T)	tardía (+6)	Invierno	media	bajo-medio	bajo-medio	media
RGT QUATERBAC	tardía (+9)	Invierno	media-alta	medio-alto	bajo	baja-media
TRIMOUR (T)	media-tardía	Invierno	media	bajo-medio	medio	media

[1] En paréntesis la diferencia en días de la fecha de espigado respecto a TRIMOUR (variedades en zonas templadas-frías)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

VARIEDAD	ENCAMADO	SEPTORIA	OIDIO	ROYA PARDA
RGT ELEAC (T)	media	media	media	media
RGT QUATERBAC	media	media	media	media
TRIMOUR (T)	media	media	baja	media



EMPRESA COMERCIALIZADORA

VARIEDAD	EMPRESA COMERCIALIZADORA
RGT ELEAC	RAGT IBÉRICA
RGT QUATERBAC	RAGT IBÉRICA
TRIMOUR	FLORIMON DESPREZ

